



- STREPSILS Miel-Citron, pastille à sucer
- STREPSILS Orange Vitamine C, pastille à sucer

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement, votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre médecin.

Ce médicament est une spécialité d'Automédication, qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.



Dans cette notice :

- 1 - Que sont les pastilles Strepsils et dans quels cas sont elle utilisées ?
- 2 - Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser les pastilles Strepsils ?
- 3 - Comment utiliser les pastilles Strepsils ?
- 4 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5 - Comment conserver les pastilles Strepsils ?
- 6 - Informations supplémentaires.

1. QUE SONT LES PASTILLES STREPSILS ET DANS QUELS CAS SONT-ELLE UTILISEES ?

Antiseptique local (R : système respiratoire)

Ces médicaments sont indiqués chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans, en cas de mal de gorge peu intense sans fièvre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LES PASTILLES STREPSILS ?

VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE ces médicaments en cas d'allergie à l'un des composants des pastilles et chez les enfants de moins de 6 ans (en raison de la taille des pastilles).

Prendre des précautions particulières avec les pastilles STREPSILS :

En raison de la présence de glucose et de saccharose, ces médicaments ne doivent pas être utilisés en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de l'un de ces médicaments n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.

Mal de gorge :

Il est nécessaire de **CONSULTER VOTRE MEDECIN** dans les cas suivants :

- survenue de fièvre,
- expectorations (crachats) purulentes,
- gêne à la déglutition des aliments,
- aggravation ou absence d'amélioration au bout de 5 jours.

Pour Strepsils Orange Vitamine C en raison d'un effet légèrement stimulant dû à la présence de vitamine C (100 mg par pastille), il est souhaitable de ne pas prendre ce médicament en fin de journée.

Strepsils Orange Vitamine C contient 2,40 g de sucre par pastille.

Strepsils Miel-citron contient 2,45 g de sucre par pastille.

En tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

Interactions avec d'autres médicaments

Ces médicaments contiennent 2 antiseptiques locaux (l'amylimétacresol et de l'alcool 2,4-dichlorobenzyle) et de la vitamine C pour Strepsils Orange Vitamine C.

D'autres médicaments en contiennent : ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir posologie et mode d'administration)

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse Allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

Informations importantes concernant certains composants des pastilles STREPSILS

Liste des excipients à effet notoire

Pour Strepsils Orange Vitamine C : Rouge Cochenille A (E 124), Glucose, Saccharose, jaune orangé S (E110)

Pour **Strepsils miel citron** : glucose, saccharose

3. COMMENT UTILISER LES PASTILLES STREPSILS ?

N'utilisez pas ces médicaments chez l'enfant de moins de 6 ans.

Posologie

Adultes et enfants de plus de 6 ans : 1 pastille, 3 à 6 fois par jour, à sucer lentement. Ne pas dépasser la posologie maximale de 6 pastilles par jour.

Fréquence d'administration

ESPACEZ LES PRISES D'AU MOINS 1 HEURE. Prendre les pastilles à distance des repas.

Mode d'administration

Voie buccale.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CES MEDICAMENTS PEUVENT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS. SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT, ET EN PARTICULIER CEUX QUI NE SERAIENT PAS MENTIONNES DANS CETTE NOTICE.

Pour **Strepsils Orange Vitamine C**, possibilité de réactions allergiques, notamment en raison de la présence de jaune orangé S et de rouge Cochenille A.

5. COMMENT CONSERVER LES PASTILLES STREPSILS ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte

Condition de conservation

Conservez ces médicaments à une température ne dépassant pas 25°C

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATION SUPPLEMENTAIRES

Que contiennent les pastilles Strepsils ?

Les substances actives sont

Amylmétacrésol.....0,6 mg

Alcool 2,4-dichlorobenzyle.....1,2 mg

Pour Strepsils Orange Vitamine C

Acide ascorbique.....33,5 mg

Ascorbate de sodium.....74,9 mg

Pour une pastille

Les autres composants sont

Strepsils miel-citron : solution de saccharose/glucose liquide/miel/acide tartrique/huile essentielle de menthe poivrée/ huile essentielle de citron déterpénée/jaune de quinoléine

Strepsils Orange Vitamine C : saccharose/glucose/acide tartrique/arôme orange (orange sanguine) PHL-134720/propylène glycol/levomenthol/jaune orangé S (E110)/rouge cochenille A (E124)

Que sont les pastilles Strepsils et contenu de l'emballage extérieur ?

Boite de 24 pastilles à sucer

Pour **Strepsils miel-citron** : boîtes de 24 et 36 pastilles



Titulaire / Exploitant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE
15, RUE AMPÈRE
91748 MASSY CEDEX

Fabricant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INT. LTD
THANE ROAD, NOTTINGHAM
NOTTINGHAMSHIRE NG90 2DB (GB)

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 01 juin 2010

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

0289392