

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 06/01/2012

Dénomination du médicament

GELOPECTOSE, poudre orale en boîte
Cellulose microcristalline / pectine / silice colloïdale hydratée

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE GELOPECTOSE, poudre orale en boîte ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GELOPECTOSE, poudre orale en boîte ?
3. COMMENT PRENDRE GELOPECTOSE, poudre orale en boîte ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER GELOPECTOSE, poudre orale en boîte ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE GELOPECTOSE, poudre orale en boîte ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Adsorbants intestinaux
(A: Appareil digestif et métabolisme)

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un épaississant.
Il est indiqué dans le traitement des régurgitations du nourrisson.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GELOPECTOSE, poudre orale en boîte ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais GELOPECTOSE, poudre orale en boîte dans les cas suivants:

- certaines maladies du tube digestif: mucoviscidose, maladie de Hirschprung,...
- ne pas associer aux médicaments antidiarrhéiques de la classe des ralentisseurs du transit.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**Faites attention avec GELOPECTOSE, poudre orale en boîte:****Précautions d'emploi**

Cette spécialité contient des terpènes (huiles essentielles de citron) en tant qu'excipients qui peuvent entraîner à doses excessives des accidents à types neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et l'enfant.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments**Prise ou utilisation d'autres médicaments:**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**Grossesse et allaitement**

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE GELOPECTOSE, poudre orale en boîte ?**Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**Posologie**

Respecter la prescription de votre médecin.

Utiliser GELOPECTOSE à la dose de 3 à 5 % (soit 3 à 5 g pour 100 ml d'eau avant reconstitution). Par exemple, pour 90 ml d'eau avant reconstitution, utiliser 2 cuillerées à café rases de Gélpectose (cf. mémo-posologique pour le nombre de cuillerée à café de Gélpectose en fonction des différents volumes d'eau).

Mémo-posologique

Eau (ml)	Gélpectose (c. à café)
90	2
120	2-3
150	3
180	3-4
210	4-5
240	5
270	5-6
300	6

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Voie d'administration

Voie orale.

Mode d'administration

Dans un biberon d'eau ou de lait reconstitué très chaud (50 à 60°C) verser la quantité prescrite de Gélpectose. Agiter vigoureusement environ 30 secondes, puis laisser reposer jusqu'à l'obtention du gel et de la température souhaitée pour l'administrer au nourrisson.

Surtout, ne pas réagiter le biberon après l'obtention du gel.

Utiliser une eau faiblement minéralisée, conseillée pour la préparation des biberons.

Le biberon peut être conservé au réfrigérateur (4°C) 24 heures maximum.

Pour l'utilisation, réchauffez- le au bain marie sans l'agiter.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de GELOPECTOSE, poudre orale en boîte que vous n'auriez dû:

Un surdosage éventuel pourra se traduire par une aggravation des effets indésirables ([voir «Quels sont les effets indésirables éventuels ?»](#)).

En outre cette spécialité contient des terpènes (huiles essentielles de citron) en tant qu'excipients qui peuvent entraîner à doses excessives des accidents à types neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et l'enfant ([voir «Faites attention avec GELOPECTOSE, poudre orale en boîte»](#)).

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, GELOPECTOSE, poudre orale en boîte est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- des cas de calculs rénaux ont été exceptionnellement rapportés; ils surviennent en général après un traitement prolongé et peuvent se révéler à distance de l'arrêt du traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER GELOPECTOSE, poudre orale en boîte ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser GELOPECTOSE, poudre orale en boîte après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Conditions de conservation

A utiliser dans les 15 jours après ouverture.
Après ouverture ce médicament doit être conservé à l'abri de l'humidité.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient GELOPECTOSE, poudre orale en boîte ?

Les substances actives sont:

Pectine	12,00 g
Cellulose microcristalline	9,00 g
Silice colloïdale hydratée	5,50 g

Pour 100 g de poudre orale.

Les autres composants sont:

Chlorure de sodium, chlorure de calcium, malto-dextrine, huile essentielle de citron.
Une cuillerée à café contient 13,85 mg de sodium
Une cuillerée à soupe contient 55,4 mg de sodium

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que GELOPECTOSE, poudre orale en boîte et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de poudre orale. Boîte de 120 g ou 240 g.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

CEDEPHARM
50, RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Exploitant

DB PHARMA
1BIS, RUE DU COMMANDANT RIVIERE
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

Fabricant

Non renseigné.

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.