

DOSISEPTINE

Solution antiseptique pour application locale en flacon pressurisé.
Gluconate de chlorhexidine 0,05%

COMPOSITION

Gluconate de chlorhexidine. 50,0 mg

Excipients : Nonoxinol 10, Alcool (titre inférieur à 0,06°) Acétate de linalyle, Gluconolactone.

Eau purifiée q.s.p . 100 ml

FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour application locale (flacon pressurisé de 50 ml).

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

Antiseptique (D. Dermatologie).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est un antiseptique (il lutte contre la prolifération des microbes).

Ce médicament est préconisé dans :

- L'antiseptie des petites plaies superficielles et peu étendues.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Allergie à la chlorhexidine (ou un médicament apparenté)
- Ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles, sur les muqueuses (nez, gorge, muqueuses génitales).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDES SPÉCIALES

- Usage externe exclusivement.
- En raison de la nature de l'excipient, la CHLORHEXIDINE 0,05 POUR CENT GIFRER ne doit pas être utilisée pour l'antiseptie des cavités internes (lavages, irrigations).
- Risque de sensibilisation à la chlorhexidine.
- Bien que la résorption transcutanée de la chlorhexidine soit très faible, le risque de passage systémique ne peut être exclu.

Ces effets systémiques pourraient être favorisés par la répétition des applications, par l'utilisation sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau lésée (notamment brûlée), une muqueuse, une peau de prématuré ou de nourrisson (en raison du rapport surface/poids et de l'effet d'occlusion des couches au niveau du siège).

- Cette spécialité ne peut être utilisée pour la désinfection du matériel médico-chirurgical ni pour l'antiseptie de la peau saine avant acte chirurgical (antiseptie du champ opératoire et antiseptie des zones de ponctions, d'injections ou de transfusions).
- Cette spécialité ne peut être utilisée chez l'enfant de moins de 30 mois sans avis médical.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS AVALER.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques locaux ou agents nettoyants (risque d'incompatibilité et d'inefficacité du produit).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT TOUJOURS SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSOLOGIE

2 applications par jour. La solution est prête à l'emploi. Elle peut être appliquée directement sur les plaies.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie cutanée.

EFFETS NON SOUHAITES ET GÊNANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins gênants.

- Possibilité de réaction allergique (eczéma, éruption cutanée).

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDIQUÉE EN CLAIR SUR LE FLACON.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25° C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Juin 1998