



HUMEX

EXPECTORANT

COMPRIMÉS À SUCER - SANS SUCRE

Acétylcystéine 100 mg

Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes.

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMÉDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
 - Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

COMPOSITION POUR UN COMPRIME DE 1,5 g

Acétylcystéine 100 mg

Excipients : Bicarbonate de sodium, Bicarbonate de potassium, Sorbitol, Xylitol, Arôme orange(*), Stéarate de magnésium.

(*) Composition de l'arôme orange : huile essentielle d'orange douce simple déterpenée, gomme arabique, maltodextrine.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé à sucer. Boîte de 20.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

MUCOLYTIQUE

(R : Système respiratoire)

Ce médicament, en modifiant les sécrétions bronchiques, facilite leur évacuation par la toux.

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires URGO

42 rue de Longvic

21 300 CHENÔVE - FRANCE

DANS QUELS CAS POUVEZ-VOUS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé chez l'adulte (plus de 15 ans) en cas d'affection respiratoire récente avec difficultés d'expectoration (difficulté à rejeter en crachant les sécrétions bronchiques).

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE DEVEZ-VOUS PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant (moins de 15 ans).

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

UN AVIS MÉDICAL EST NÉCESSAIRE

- en cas d'expectoration grasse et purulente, de fièvre,
- si vous êtes atteint d'une maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons,
- en cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce médicament doit toujours être accompagné d'efforts volontaires de toux, permettant l'expectoration.

Ne prenez pas de médicament antitussif (destiné à calmer la toux) ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par l'acétylcystéine.

L'absence de guérison au bout de 5 jours de traitement impose de PRENDRE L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN.

En cas de régime hypocalorique tenir compte de l'apport de 5 kcal par comprimé à sucer.



HUMEX

EXPECTORANT

COMPRIMÉS À SUCER - SANS SUCRE

Acétylcystéine 100 mg

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES

INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT TRAITEMENT EN COURS.

Ce médicament contient de l'**acétylcystéine**. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

SI VOUS ÊTES ENCEINTE OU SI VOUS ALLAITEZ

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Il est possible d'allaiter votre enfant en cas de traitement par ce médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE DU MÉDICAMENT PAR LE PATIENT

Sorbitol (520 mg/comprimé).

COMMENT DEVEZ-VOUS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

N'utilisez pas ce médicament chez l'enfant de moins de 15 ans.

POSOLOGIE

Adultes (plus de 15 ans) : Prendre 2 comprimés à sucer 2 à 3 fois par jour (soit 400 à 600 mg par jour). Ne pas dépasser 6 comprimés à sucer par jour.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Laissez fondre lentement les comprimés à sucer dans la bouche sans les croquer.

ESPACEZ LES PRISES D'UN MINIMUM DE 4 HEURES

Prenez de préférence les comprimés à sucer avant les principaux repas.

DURÉE DU TRAITEMENT

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

N'hésitez pas à prendre l'avis de votre médecin si les symptômes persistent au bout de 5 jours de traitement.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de surdosage accidentel, ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MÉDECIN.

QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS DU MÉDICAMENT ?

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- Possibilité de troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées,

Il est conseillé dans ces cas de réduire la posologie.

SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INSCRITE SUR L'EMBALLAGE.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

01/2000